

## FOGAK

### A Turner-szindróma szempontjából

1. A következő fogászati problémák gyakoriak lehetnek TS-ben, ezért a fogorvosoknak a további információkért fontos lehet megismerniük a TS Klinikai Gyakorlatának Irányelveit.<sup>1</sup>

(Ahhoz, hogy megelőzzük a fog deformitásokat, a zsúfolt fogakat, a trismust, a rágási nehézségeket, a légzési obstrukciót és az emésztési zavarokat, a fogak megfelelő igazodásának eltéréseit nélkülözhetetlen kezelni. A TS-es személyek fogászati és fogszabályozó kezelésének irányelvei a rutin ellátás módosulásait tükrözik, melyeket a TS-el kapcsolatos különbségek - a növekedés aránya és időzítetttsége, az arckoponya struktúráinak fejlődése és a fogászati morfológia – tehetnek szükségessé.)\*

- A maradandó fogak **korai előtörése**.
- **Vékonyabb fogzománc és kevesebb dentin**.
- **Felszínesebb foggyökerek**, amelyek a foggyökerek felszívódásának kockázatát hordozhatják magukkal, és fogvesztéshez vezethetnek, különösen fogászati kezeléseik során.
- Egyéb problémák, amelyek befolyásolhatják a táplálást/étkezést vagy beszédet, mint **a zsúfolt fogak – a kicsi állkapocs és keskeny, magas szájpád** miatt.

2. TS-ben gyakoribb a szívrendellenesség, ezért különös tekintettel meg kell **vizsgálni és fontolni az antibiotikum profilaxis szükségességét** TS-es személy esetében.

---

<sup>1</sup> New Clinical Practice Guidelines for the care of girls and women with Turner-Syndrome, 37. o.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28705803>, vagy <http://www.eje-online.org/content/177/3/G1.full.pdf>