

VIZSGÁLATI ELLENŐRZŐ LISTA TURNER-SZINDRÓMA GYERMEK

Szükséges vizsgálat	A diagnózis felállításakor	Bizonyos életkorban	Minden orvosi vizsgálat során, legalább évente	Évente	Minden X évben
Teljes körű kivizsgálás (beleértve a magasságot, súlyt, pulzust; + nyirok-ödéma, fülgyulladás esetleges megállapítását)	X		X		
Vérnyomás vizsgálata	X		X		
Pajzsmirigy működés vizsgálata (TSH és szabad T4)	X	4 éves kor körül kezdeni		X	
Vérvizsgálat: lipid értékek (koleszterin)		17-18 éves korban kezdeni		X	
Vérvizsgálat: májfunkciós értékek (GOT, GPT, AP...)		10 éves korban kezdeni		X	
Vérvizsgálat: vércukor, HbA1C		10 éves korban kezdeni		X	
Vérvizsgálat: D vitamin szint		9-11 éves korban kezdeni			X 2-3 évente
Coeliakia vizsgálat (glutén érzékenység)		2-3 éves korban kezdeni			X 2 évente
Vesicultrahang	X				
Hallásvizsgálat (specialista által)	X	9-12 hónapos korban kezdeni			X 3 évente
Szemvizsgálat (specialista által)	X	12-18 hónapos korban kezdeni		X	
Fogászati ellenőrzés, fogszabályzás mérlegelése	X ----	----- 8 éves kor körül kezdeni		X X	
Bőr vizsgálat (anyajegyek)	X			X	
Csípőficam		Újszülött korban			
Skoliosis, kyphosis (gerinc ferdtülés)		4 éves korban kezdeni	X		
Csontsűrűség vizsgálat (DEXA)		5-6 éves korban és 12-14 éves korban és az ösztrogén szint csökkenésekor			

Szükséges vizsgálat	A diagnózis felállításakor	Bizonyos életkorban	Minden orvosi vizsgálat során, legalább évente	Évente	Minden X évben
Kardiológiai vizsgálat EKG TTE = szívultrahang vagy kardiológiai MRI (TSZ = TS specifikus Z érték - aorta méretére utal)	X			X 6 hó - 2 évente, ha van eltérés	X 5 évente, ha nincs eltérés
Neuro-pszichológiai vizsgálatok/értékelés (szociális készségek, tanulási zavarok ... kognitív/pszichológiai lehetséges eltérések)	X	Óvodás korban, Iskolakezdekskor, Középiskola kezdése előtt Főiskola/egyetem kezdése előtt			
+ Kapcsolat felvétele támogató csoporttal	X				

A fenti vizsgálatokat el lehet végezni korábban és gyakrabban is az ajánlottnál, ha szükséges vagy eltérést találnak.