

## ÚJSZÜLÖTTEK

### *TURNER-SZINDRÓMÁS LÁNYOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA SZÜLETÉSTŐL EGY HÓNAPOS KORIG:*

- Bizonyosodjunk meg a Turner-szindróma diagnózisát illetően és nézzük át a **kromoszóma-vizsgálat** eredményét. Ha volt prenatális diagnózis, **beszéljük meg egy genetikussal**, hogy további citogenetikai vizsgálat elvégzése szükséges-e.
- Mérjük föl, hogy a gyermek a **Turner-szindróma mely tipikus jeleit** viseli magán.  
Meg kell különböztetni azokat az **elváltozásokat**, melyek jelentős befolyással lehetnek az **egészségügyi** állapotra (pl. szív- vagy veseelváltozásokat) azoktól, melyek inkább **szépészeti** vagy **pszichológiai** jellegűek.
- Minden orvosi vizsgálat alkalmával mérjük meg a **vérnyomást** és a **perifériás pulzust** Alaposan össze kell hasonlítani a **karon és a lábszáron** mért szisztolés vérnyomást, mert fontos az esetleges aortaszűkültre utaló jelek felismerésében.
- Egyeztessünk egy első konzultációt olyan kardiológussal, aki tapasztalt a **gyermek-kardiológia** terén, akkor is, ha „normális” volt a születés előtti ultrahang vizsgálatok eredménye, mert a kétágú aorta billentyű vagy az aortaszűkület elkerülhette a figyelmet. Ezért minden TS-es újszülött esetében **szívultrahang vizsgálatot** kell végeztetni.
- Beszéljük meg a **szubakut bakteriális endokarditisz** (szívbelhártya-gyulladás) **kórmegelőzés** lehetőségét, ha fennáll valamilyen szívelváltozás.
- Nézzük át az újszülött **hallásvizsgálatának** eredményeit.
- Végeztessünk **veseultrahangot**, vagy ismételjük meg, ha méhen belül már elvégezték. Ha a húgyvezetéknel rendellenességet találnak, a **húgyvezeték és a vesefunkció folyamatos figyelése** szükséges.
- Vizsgáljuk meg a gyermek **csípőjét**, nincs-e csípőficama. Ezt a vizsgálatot a korai csecsemőkor során többször meg kell ismételni.
- Egyeztessük az első konzultáció időpontját egy **gyermek-endokrinológussal**, hogy megbeszélhessük a jelenlegi álláspontot a **növekedéssel** és a **másodlagos nemi jellegekkel** kapcsolatban. Mutassunk rá, hogy a **terméketlenség majdnem mindig** fennáll, bár a mesterséges megtermékenyítés különböző technikái esetlegesen lehetővé tehetik meddő Turner-szindrómával élő nőknek, hogy saját gyermekük legyen.
- Beszéljük meg az **etetéssel** kapcsolatos esetleges nehézségeket. Vannak olyan Turner-szindrómával élő csecsemők, akiknek **elégtelenek a szopó- és nyelő-reflexei, a gyenge orális motoros funkció** miatt.
- Tájékoztassuk a családot, hogy a **nyiroködéma** hónapokig vagy akár tovább is fennállhat, és később újra jelentkezhet.
- + Beszéljünk arról a családdal, **hogyan és mit mondjanak el** a többi családtagoknak és a barátoknak.